

Forbruk av antibiotika

2012-2017

SUNNAAS SYKEHUS HF




Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika ved Sunnaas Sykehus HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika ved Sunnaas Sykehus HF 2012 - 2017


korrigert for liggedøgn






Forbruk av foretrukne antibiotika (penicilliner og aminoglykosider) ved Sunnaas Sykehus HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika ved Sunnaas Sykehus HF





Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) ved Sunnaas Sykehus HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika ved Sunnaas Sykehus HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2017
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut mars 2018.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@sav.no