

ANTIBIOTIKAFRI resept

Navn:

Legen har funne ut at du ikkje treng antibiotika mot plagene dine. Dette arket viser deg kor lenge plagene pleier å vare, kva du sjølv kan gjere for å bli betre, og når du eventuelt bør oppsøke lege igjen.

Din infeksjon varer gjerne i

- Øyrebetennelse..... **4 dagar**
- Halsbetennelse..... **7 dagar**
- Forkjøling..... **10 dagar**
- Bihulebetennelse **18 dagar**
- Hoste/bronkitt **21 dagar**
- **dagar**

Eigenbehandling

- Sørg for kvile
- Rikeleg med drikke
- Feber er eit teikn på at kroppen slåst mot infeksjonen og går etter kvart over. Du kan bruke paracetamol (eller ibuprofen) dersom du/barnet ditt er plaga av feberen
- Spør gjerne på apoteket etter midler som kan lindre plagene dine
- Andre råd:

Dei fleste luftvegsinfeksjonar

går over utan bruk av antibiotika. Kroppen klarer som regel å bekjempe desse infeksjonane sjøl.

Jo meir antibiotika vi bruker, jo større er faren for at bakteriane utviklar resistens, slik at antibiotika ikkje lenger har effekt.

Antibiotika kan gi biverknader som utslett, magesmerter, diare, soppinfeksjon i underlivet (kvinner), overkjensle for sol, og andre plager.

Del aldri antibiotika du har fått resept på til deg sjøl med andre, og returner ubrukte antibiotika til apoteket slik at dei kan kastast på forsvarleg vis.



Du bør søke legehjelp raskt ved:

- Kraftig hovudverk og sjukdomskjensle
- Kald og klam hud eller uvanleg utslekk
- Forvirring, nedsett merksemeld eller talevanskar
- Pustevanskar
- Blå lepper
- Brystsmerter
- Svelgvanskar/sikling
- Hoste med blod
- Kraftig forverring av symptomata



Mindre alvorlege symptom

som vanlegvis kan vente til du får time hos fastlegen:

- Ikkje bra innan tida som er antyda
- For barn med øyrebetennelse: væsing fra øyret eller redusert hørsel
- Anna:

I nokre tilfeller kan det være vanskeleg å avgjere om du treng antibiotika. Då kan legen velje å gi deg ein vent-og-sjå-resept.

Legen har gitt deg vent-og-sjå-resept på antibiotika

Du bør vente og sjå det an i dagar

Om du ikkje er blitt betre i løpet av desse dagane, bør du starte på antibiotikakuren.

Andre tilhøve som gjer at du bør starte på kuren:

Dersom du opplever kraftig forverring, eller nokre av dei andre symptomata som er lista opp øvst på denne sida, bør du søke legehjelp raskt – uansett om du har starta på antibiotikakuren eller ikkje.

