

## Quiz om penicillinallergi

For noen av spørsmålene er flere svaralternativer riktig. Korrekte svaralternativer er understreket.

- 1) **Hvilke antibiotika reagerer du på om du har penicillinallergi?**
  - a. Alle antibiotika
  - b. Penicilliner
  - c. Trimetoprim/sulfa
  - d. Kun Apocillin
  
- 2) **Hvilke symptom(er) er vanligst ved penicillinallergi?**
  - a. Utslett og hevelse
  - b. Hoste
  - c. Kvalme og oppkast
  - d. Allergisk sjokk
  
- 3) **Ca hvor stor andel av pasienter innlagt i sykehus har journalopplysninger om at de er allergiske mot penicillin?**
  - a. 1 av 2
  - b. 1 av 100
  - c. 1 av 5
  - d. 1 av 10
  
- 4) **Hvordan kan en få fastslått om en pasient virkelig har penicillinallergi?**
  - a. Allergologisk utredning
  - b. Spørre fastlegen
  - c. Sjekke journal
  - d. Spørre pasientens mor
  
- 5) **Hvor raskt etter administrering av penicillin oppstår vanligvis symptomene på penicillinallergi?**
  - a. Noen dager etter at behandlingen er avsluttet
  - b. Neste gang du tar antibiotika
  - c. Raskt (< 2 timer)
  - d. Inntil 10 år etterpå

- 6) **Hvilke konsekvenser kan penicillinallergi ha?**
- Pasientene får mer bredspektret behandling enn nødvendig
  - Oppstart av antibiotikabehandling blir forsinket
  - Økt bruk av sykehustjenester
  - Økt forekomst av antibiotikaassosiert diare (*C. diff*)
- 7) **Hva betyr ordet «cave» i «cave penicillin»?**
- Sjekk ut
  - Skal ikke ha
  - Vokt deg for
  - Kontraindisert
- 8) **Hvor stor andel av pasientene som har opplysninger om penicillinallergi i journal viser seg å ikke ha penicillinallergi når de blir utredet?**
- 10 %
  - 50 %
  - 90 %
  - 100 %
- 9) **Hvor finner du lett informasjon om hvilke alternative antibiotika som bør velges til pasienter med penicillinallergi?**
- Under de enkelte antibiotika-anbefalingene i nasjonale faglige retningslinjer
  - I Felleskatalogen
  - I UpToDate
  - Hos fastlegen



**LYKKE TIL!**

Klok bruk av antibiotika – du kan gjøre en forskjell