

Quiz om penicillinallergi

For noen av spørsmålene er flere svaralternativer riktig

- 1) **Hvilke antibiotika reagerer du på om du har penicillinallergi?**
 - a. Alle antibiotika
 - b. Penicilliner
 - c. Trimetoprim/sulfa
 - d. Kun Apocillin

- 2) **Hvilke symptom(er) er vanligst ved penicillinallergi?**
 - a. Utslett og hevelse
 - b. Hoste
 - c. Kvalme og oppkast
 - d. Allergisk sjokk

- 3) **Ca hvor stor andel av pasienter innlagt i sykehus har journalopplysninger om at de er allergiske mot penicillin?**
 - a. 1 av 2
 - b. 1 av 100
 - c. 1 av 5
 - d. 1 av 10

- 4) **Hvordan kan en få fastslått om en pasient virkelig har penicillinallergi?**
 - a. Allergologisk utredning
 - b. Spørre fastlegen
 - c. Sjekke journal
 - d. Spørre pasientens mor

- 5) **Hvor raskt etter administrering av penicillin oppstår vanligvis symptomene på penicillinallergi?**
 - a. Noen dager etter at behandlingen er avsluttet
 - b. Neste gang du tar antibiotika
 - c. Raskt (< 2 timer)
 - d. Inntil 10 år etterpå

- 6) **Hvilke konsekvenser kan penicillinallergi ha?**
- a. Pasientene får mer bredspektret behandling enn nødvendig
 - b. Oppstart av antibiotikabehandling blir forsinket
 - c. Økt bruk av sykehustjenester
 - d. Økt forekomst av antibiotikaassosiert diare (*C. diff*)
- 7) **Hva betyr ordet «cave» i «cave penicillin»?**
- a. Sjekk ut
 - b. Skal ikke ha
 - c. Vokt deg for
 - d. Kontraindisert
- 8) **Hvor stor andel av pasientene som har opplysninger om penicillinallergi i journal viser seg å ikke ha penicillinallergi når de blir utredet?**
- a. 10 %
 - b. 50 %
 - c. 90 %
 - d. 100 %
- 9) **Hvor finner du lett informasjon om hvilke alternative antibiotika som bør velges til pasienter med penicillinallergi?**
- a. Under de enkelte antibiotika-anbefalingene i nasjonale faglige retningslinjer
 - b. I Felleskatalogen
 - c. I UpToDate
 - d. Hos fastlegen



LYKKE TIL!

Klok bruk av antibiotika – du kan gjøre en forskjell