

Forbruk av antibiotika

2016 - 2023

HELSE SØR-ØST RHF



Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF


Antall DDD, **ikke** korrigert for aktivitet





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF 2016 - 2023

korrigert for liggedøgn






Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika* pr HF/sykehus i Helse SørØst RHF

korrigert for liggedøgn

*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.

Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sørlandet sykehus HF	19,71	17,88	16,14	15,20	15,23	16,91	18,97	18,42
Sykehuset Telemark HF	16,53	14,36	14,91	11,98	14,44	16,39	19,81	18,11
Sykehuset i Vestfold HF	19,76	16,89	19,83	19,12	19,24	20,37	19,97	19,54
Vestre Viken HF	18,94	18,16	18,08	16,72	15,26	15,96	17,66	18,21
Sunnaas sykehus	2,28	1,50	1,02	1,03	1,72	1,91	2,35	1,92
Diakonhjemmet sykehus	17,02	17,48	14,40	14,23	13,21	14,56	15,04	16,23
Lovisenberg diakonale sykehus	16,25	16,41	15,79	14,20	15,41	17,40	20,11	17,98
Oslo Universitetssykehus HF	15,87	15,31	14,87	14,44	15,08	15,19	16,08	15,30
Akershus Universitetssykehus HF	18,43	17,77	16,00	16,26	16,47	17,27	18,02	16,34
Sykehuset Innlandet HF	15,83	15,23	14,90	13,52	14,96	14,34	17,99	16,43
Sykehuset Østfold HF	19,43	21,21	19,00	16,97	17,77	20,22	21,44	18,66



Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)


Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn





Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Sør-Øst RHF




Grunnlaget for grafen er justert i forhold til tidligere publiseringer:
- Alle cefalosporiner (unntatt 1. generasjon), inkludert kombinasjonspreparater er inkludert i gruppen Resistensdrivende antibiotika
- Tigesyklin og kolistin er inkludert i gruppen Resistensdrivende antibiotika



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Sør-Øst RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid



Grafen er justert i forhold til tidligere publiseringer:


- Alle cefalosporiner med unntak av 1. generasjon, inkludert kombinasjonspreparater, er slått sammen til en gruppe



Totalforbruk av antibiotika Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2016 - 2023
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i mars 2024.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.

epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no