

















GODE RÅD TIL ANTIBIOTIKAPASIENTEN































Dette er kortversjonen til bransjestandard for antibiotika. For utfyllende informasjon se resurssiden på [Apotekinfo](https://www.apotekinfo.no) eller [antibiotika.no](https://www.antibiotika.no)



Antibiotika – med mat eller utenom måltider?

- De fleste typer antibiotika kan tas både med mat og utenom måltider
- Mage-tarm-bivirkninger kan reduseres ved samtidig matinntak
- Det er viktigere å ta antibiotika til forskrevne doseringstidspunkter fremfor tilpasning til måltider

Antibiotika	Preparat			A	Fe	
		Bør svelges hele i stående stilling, ikke liggende.	Kapsler kan åpnes, blandes ut i vann og drikkes. Tabletter kan knuses/deles.	Bør ikke tas samtidig med Antacida.	Bør ikke tas samtidig med jern, magnesium og sink.	Kan gi hudirritasjon i sola. Bruk solkrem.
		Bør ikke tas med meieriprodukter	Bør svelges hele, vond/bitter smak			
Amoksicillin	Amoxicillin® Augmentin® Imaxi®		 Ikke Imaxi			
Azitromycin	Azitromax® Zitromax®			A		
Ciprofloxacin	Ciprofloxacin®		 Bitter smak	A	Fe	
Cefaleksin	Keflex®		 Bruk hansker ved deling			
Dikloksacillin	Dicloxacillin®					
Doksisyklin	Doksycylin® Oracea® Vibranord®		 Ikke Oracea	A	Fe	
Erytromycin	Abboticin® Ery-Max®					
Fenoksymetylpenicillin	Apocillin® Weifapenin®					
Fusidinsyre	Terra-Cortril®					
Klaritromycin	Clarithromycin® Klacid®		 Ikke Klaritromycin			

Antibiotika	Preparat			A	Fe	
		Bør svelges hele i stående stilling, ikke liggende.	Kapsler kan åpnes, blandes ut i vann og drikkes. Tabletter kan knuses/deles.	Skal ikke tas samtidig med Antacida.	Skal ikke tas samtidig med jern, magnesium og sink.	Kan gi hudirritasjon i sola. Bruk solkrem.
		Skal ikke tas med meieriprodukter	Skal svelges hele, vond/bitter smak			
Klindamycin	Dalacin®					
Linezolid	Linezolid®		 Bruk hansker ved deling			
Lymesyklin	Lymecyclin® Tetralsal®			A	Fe	
Metronidazol	Flagyl®, Metronidazol® Zidoval®		 Bitter smak			
Moksifloksacin	Moxifloxacin®			A	Fe	
Nitrofurantoin	Furadantin®					
Ofloksacin	Tarivid®			A	Fe	
Pivmecillinam	Penomax® Selexid®		 Bitter smak			
Rifampicin	Rimactan®					
Spiramycin	Rovamycin®					
Tetrasyklin	Tetracyklin®			A	Fe	
Trimetoprim	Trimetoprim®					
Trimetoprim + sulfametozazol	Bactrim®					
Vankomycin	Vancomycin®					

Ved spørsmål ta kontakt: post@antibiotikasenteret.no